

Optimiser la fertilisation azotée



Pour quoi faire?

Mieux utiliser les engrais azotés, responsables d'émissions d'ammoniac et de gaz à effet de serre par volatilisation lors des épandages. L'ammoniac est un polluant atmosphérique néfaste à l'environnement et à la santé humaine.



L'agriculture est responsable de 98% des émissions d'ammoniac en Normandie en 2014 (*Atmo Normandie*). Le NH₃ est un précurseur de particules secondaires, c'est-à-dire qu'il se combine avec d'autres molécules dans l'air pour former des particules fines. Les particules fines ont un impact sanitaire et environnemental important.

Quels leviers sur mon exploitation?

- Je fais attention aux techniques et aux conditions d'épandage pour limiter les pertes d'azote
- Je privilégie les engrais organiques
- Je raisonne mes apports de fertilisants

J'optimise l'efficacité de l'azote apporté :

C'est bon pour la qualité de l'eau

Si l'azote est mieux utilisé par les plantes, il y aura moins de fuites par lessivage ou ruissellement.

- je **fractionne les apports** pour les positionner au plus près des besoins des plantes,
- je privilégie la **fertilisation localisée**,
- je **retarde ou supprime** le 1^{er} apport d'azote
- j'enfouis les effluents organiques et les engrais minéraux avant les semis de printemps pour éviter les pertes d'ammoniac par volatilisation,
- je tiens compte des **conditions climatiques** et je ne réalise pas les épandages par temps trop chaud ou trop venteux.

Je privilégie l'utilisation de l'azote organique :

- la fabrication des engrais minéraux est consommatrice d'énergie fossile et émettrice de GES,
- le transport des engrais minéraux entraine des émissions d'oxydes d'azote et de CO_a,
- les **engrais organiques émettent moins d'ammoniac** lors des épandages.

Les formes uréiques d'engrais minéraux présentent plus de risques d'émissions d'ammoniac. Lorsque c'est possible, privilégier l'ammonitrate, forme la moins émettrice. (INRA, 2015)

Je raisonne la fertilisation et j'utilise un outil de pilotage :

- je réalise des bilans azotés,
- je réalise des **reliquats d'azote** en sortie d'hiver,
- j'utilise des outils de pilotage, la télédétection (à partir d'images prises par satellite), le pilotage par drone ou le guidage par GPS,
- je fixe des **objectifs de rendement à la parcelle** pour mieux ajuster la dose d'engrais minéral,
- en **optimisant le nombre d'interventions** je réduis les émissions de particules primaires liées au passage d'engins.



Outils de pilotage (Farmstar)



Fertilisation localisée



Innovation technologique (Drone)







					-
Dose	Reprise C1	Entre nœuds visibles	Boutons accolés cachés D1	Boutons accolés D2	Boutons séparés E
Petits colzas Dose de 160 à 220 N	20%	40% 50% 40% 40%		40%	
Colzas moyens				50%	
Dose de 120 à 220 N					20%
Gros et Très gros colzas Dose inférieure à 120 u			1 à 2 passages		

Fractionnement des apports



Je diminue les émissions de gaz à effet de serre et de leurs précurseurs, responsables du réchauffement climatique.

CO,: dioxyde de carbone

NH₃: ammoniac

GES: Gaz à Effet de Serre

PPA: Plan de Protection de l'Atmosphère

INRA: Institut National de la Recherche Agronomique
ATMO NORMANDIE: association agréée de surveillance de la qualité de l'air en Normandie





Je peux économiser **18 €/ha/an** sur mes achats d'engrais (ADEME, 2013) Soit une économie possible d'environ 9 €/ha/an.



Suppresion du premier apport d'azote

Je peux économiser **22,7 €/ha/an** sur mes achats d'engrais (ADEME, 2013)

Quel gain pour la planète?

Si toutes les exploitations de l'Eure et de la Seine-Maritime (périmètre du PPA) optimisaient leur utilisation d'engrais azotés minéraux, ce serait jusqu'à :



Soit 22 % des émissions totales d'ammoniac sur le territoire du PPA en 2014. (Atmo Normandie)

810 t de NO_x émis en moins par an



Soit 14,9 % des émissions d'oxydes d'azote du secteur agricole sur le périmètre du PPA en 2014. (Atmo Normandie)

Le saviez-vous

563 t de N₂O émis en moins par an e N₂O est un gaz à effet de serre. L'agriculture / sylviculture représente 89 % des émissions en France métropolitaine en 2014, il provient essentiellement de la transformation des produits azotés dans les sols. (citepa.org)

En bref ...

- Je fractionne mes apports d'azote
- Je choisis les techniques d'épandage adaptées
- Je tiens compte des conditions météorologiques lors des épandages
- Je privilégie la fertilisation organique
- Je raisonne mes apports d'azote et je limite le nombre d'interventions
- J'utilise un outil de pilotage de la fertilisation

J'économise sur mes achats d'engrais et je réduis les émissions d'ammoniac et de GES C'est bon pour la qualité de l'air et le climat

Je fais des économies

NH_a: ammoniac // NOx: oxydes d'azote // N_aO: protoxyde d'azote // GES: Gaz à Effet de Serre

PPA: Plan de Protection de l'Atmosphère

CITEPA: Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique

ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

Une fiche technique plus détaillée est disponible à la demande et sur les sites internet de la DREAL, des Chambres d'agriculture de Normandie et d'Atmo Normandie